

# ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄԵՐԸ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԱՄԵՆԱԱՆՎՏԱՆԳ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՄԻՋՈՑՆ ԵՆ

Այսօր Ձեր երեխան ստանում է \_\_\_\_\_ պատվաստումը

Հաջորդ պատվաստումը ստանալու է \_\_\_\_\_

## ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄԵՐԸ՝



Պաշտպանում են վարակիչ հիվանդություններից



Կանխարգելում են հիվանդության բարդությունները, այդ թվում՝ հաշմանդամությունը և մահը



Պաշտպանում են խոցելի անձանց, ովքեր չեն կարող պատվաստվել



Առողջության իրավունքի մի մասն են կազմում

## ԻՆՉ ԿՈՂՄԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՐՈՂ Է ՈՒՆԵՆԱԼ ԻՄ ԵՐԵՒԱՆ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄԻՑ ՀՅՏՈ

- Ջերմության բարձրացում
- Ներարկման տեղի կարմրություն, այտուց, ցավ
- Անհանգստություն

\* Ծանր հետևանքները ծայրահեղ հազվադեպ են:

## ԻՆՉ ԿԱՐՈՂ ԵՄ ԱՆԵԼ ԱՅՂ ԴԵՊՈԽՄ

- 38.5°C և բարձր ջերմության դեպքում բժշկի ցուցումով՝ տալ ջերմիջեցնող, մոմիկի, օշարակի կամ հաքի ձևով
- Ներարկման տեղի կարմրության կամ այտուցի դեպքում՝ դնել ծորակի ջրով սառը թրջոց
- Անհանգստության դեպքում բժշկի ցուցումով՝ տալ ցավազրկող (ջերմիջեցնող), եթե նույնիսկ ջերմությունը բարձր չէ

## ԵԹԵ ԵՐԵՒԱՆ ՀԻ ՊԱՏՎԱՍՏՎԵԼ ԱՊԱ ԿԱՐՈՂ Է՝

- Հիվանդանալ ծանր վարակիչ հիվանդություններով
- Առաջանալ հիվանդության լուրջ բարդություններ,

օրինակ՝ ուղեղի թաղանթի բորբոքում (մենինգիտ), ուղեղի կաթված, թոքաբորբ, հաշմանդամություն և նույնիսկ մահ

# ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄԵՐԸ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԱՄԵՆԱԱՆՎՏԱՆԳ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՄԻՋՈՑՆ ԵՆ

Այսօր Ձեր երեխան ստանում է \_\_\_\_\_ պատվաստումը

Հաջորդ պատվաստումը ստանալու է \_\_\_\_\_

## ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄԵՐԸ՝



Պաշտպանում են վարակիչ հիվանդություններից



Կանխարգելում են հիվանդության բարդությունները, այդ թվում՝ հաշմանդամությունը և մահը



Պաշտպանում են խոցելի անձանց, ովքեր չեն կարող պատվաստվել



Առողջության իրավունքի մի մասն են կազմում

## ԻՆՉ ԿՈՂՄԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՐՈՂ Է ՈՒՆԵՆԱԼ ԻՄ ԵՐԵՒԱՆ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄԻՑ ՀՅՏՈ

- Ջերմության բարձրացում
- Ներարկման տեղի կարմրություն, այտուց, ցավ
- Անհանգստություն

\* Ծանր հետևանքները ծայրահեղ հազվադեպ են:

## ԻՆՉ ԿԱՐՈՂ ԵՄ ԱՆԵԼ ԱՅՂ ԴԵՊՈԽՄ

- 38.5°C և բարձր ջերմության դեպքում բժշկի ցուցումով՝ տալ ջերմիջեցնող, մոմիկի, օշարակի կամ հաքի ձևով
- Ներարկման տեղի կարմրության կամ այտուցի դեպքում՝ դնել ծորակի ջրով սառը թրջոց
- Անհանգստության դեպքում բժշկի ցուցումով՝ տալ ցավազրկող (ջերմիջեցնող), եթե նույնիսկ ջերմությունը բարձր չէ

## ԵԹԵ ԵՐԵՒԱՆ ՀԻ ՊԱՏՎԱՍՏՎԵԼ ԱՊԱ ԿԱՐՈՂ Է՝

- Հիվանդանալ ծանր վարակիչ հիվանդություններով
- Առաջանալ հիվանդության լուրջ բարդություններ,

օրինակ՝ ուղեղի թաղանթի բորբոքում (մենինգիտ), ուղեղի կաթված, թոքաբորբ, հաշմանդամություն և նույնիսկ մահ

## ՀԻՇԵ՛Ք

Եթե պատվաստումից հետո ջերմությունը պահպանվում է 48 ժամ և ավել, ապա **դիմե՛ք բժշկի՛** հնարավոր է այն նոր սկսվող հիվանդության նշան է: Հետպատվաստումային շրջանում ամառազանգ ամառազանգ և վիճակի ցանկացած խնդրի դեպքում **դիմե՛ք բժշկի՛** կամ զանգահարեք հետևյալ հեռախոսահամարով

## ՀԻՇԵ՛Ք

Եթե պատվաստումից հետո ջերմությունը պահպանվում է 48 ժամ և ավել, ապա **դիմե՛ք բժշկի՛** հնարավոր է այն նոր սկսվող հիվանդության նշան է: Հետպատվաստումային շրջանում ամառազանգ ամառազանգ և վիճակի ցանկացած խնդրի դեպքում **դիմե՛ք բժշկի՛** կամ զանգահարեք հետևյալ հեռախոսահամարով



ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ		ԶՊԱՏՎԱՍՏՎԱԾ ԿԱՄ ԱՆՂԱՅՑ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՅՈՒՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿՈՎ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՆՉԵՐԸ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐ
ՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ	ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
Ծնվելուց հետո՝ 0-24 ժամվա ընթացքում	ՎՅԲ	Մինչև 15 օրականը
Ծնվելուց հետո՝ 0-48 ժամվա ընթացքում	ԲՑԺ	Մինչև 12 ամսականը՝ մինչև 8 շաբաթ, առանց տուբերկուլինային փորձի, 8 շաբաթ. մինչև 12 ամս. փորձը դնելուց հետո
6 շաբաթական	ԱԿՐՓ/ՎՅԲ/ՅԻԲ/ԻՊՊ, ՌՈՏԱ, ՊՆԵՎՄՈ (դիֆթերիա, փայտացում, կապույտ հազ, վիրուսային հեպատիտ Բ, հեմոֆիլուս ինֆլուենզա Բ տիպի, ինակտիվացված պոլիոմիելիտ)	Մինչև 12 ամսականը՝ - ԱԿՐՓ/ՎՅԲ/ՅԻԲ/ԻՊՊ, ՊՆԵՎՄՈ-3 դեղաչափ՝ 4 շաբաթ ընդմիջումով - ՌՈՏԱ - 1-ին դեղ.՝ մինչև 15 շաբաթ, եթե 1-ին դեղ. չի ստացել այլևս չի ստանա. եթե ստացել է՝ մինչև 32 շաբաթ. 2-րդ. դեղ. - ՊՆԵՎՄՈ՝ եթե մինչև 12 ամսականը չի ստացել, ապա մինչև 24 ամսականը՝ 2 դեղաչափ, 2 տար. -ից մինչև 18 տար.՝ 1 դեղ.
12 շաբաթական	ԱԿՐՓ/ՎՅԲ/ՅԻԲ/ԻՊՊ, ՌՈՏԱ, ՊՆԵՎՄՈ	
18 շաբաթական	ԱԿՐՓ/ՎՅԲ/ՅԻԲ/ԻՊՊ, ՊՆԵՎՄՈ	
12 ամսական	ԿԿԽ-1	ԿԿԽ՝ 1-ին դեղ. մինչև 18 տարեկանը
12 ամսական	ԶՐԾԱՂԻԿԻ ԴԵՄ /2024թ-ից/	1-ին դեղ.՝ 2024թ-ից՝ 12 ամս. և 15-16 տ.՝ 2 դեղ.՝ 4 շաբաթ ընդմիջում
18 ամսական	ԱԿՐՓ/ԻՊՊ	1-5 տարեկանը - ԱԿՐՓ/ՎՅԲ/ՅԻԲ/ԻՊՊ-3 դեղաչափ՝ 4 շաբաթ ընդմիջումով, 6 ամիս անց՝ ԱԿՐՓ/ԻՊՊ
4-6 տարեկան	ԿԿԽ-2	Մինչև 18 տարեկանը
4-6 տարեկան	ԶՐԾԱՂԻԿ	2-րդ. դեղ.՝ 2027թ-ից
6 տարեկան	ԱԿՐՓ/ԻՊՊ	6-14տ 14տ 11 ամս 29 օր՝ ԱԿՐՓ/ԻՊՊ-3 դեղաչափ՝ 4 շաբաթ ընդմիջում
13 տարեկան աղջիկներ	ՄՊՊ (մարդու պայպիլոմավիրուսային վարակ)՝ 2 դեղաչափ 6 ամիս ընդմիջումով	14տ 11 ամս 29 օրակ-ից բարձր՝ մինչև 45 տ.՝ 3 դեղ.՝ 0, 2, 6 ամիս ընդմիջում
15-16 տարեկան	ԱՓՂԿ (ադաստել)	ԱՓՂԿ՝ 3 դեղաչափ՝ 4 շաբաթ ընդմիջում, մինչև 18 տարեկանը
15-16 տարեկան նախազորակոչի ենթակա անձինք	ԶՐԾԱՂԻԿ	2 դեղաչափ 4 շաբաթ ընդմիջում /2024թ-ից/
	ՄԵՆԻՆԳՈ, ՊՆԵՎՄՈ, ՎՅԱ (վիրուսային հեպատիտ Ա)	16-ից բարձր՝ նախազորակոչ-զորակոչի ենթակա անձինք
	ԿԿԽ	2 դեղաչափ չունեցողներին
17 տարեկան նախազորակոչի ենթակա անձինք	ՏՈՒԱՐԵՄԻԱ	17-ից բարձր զորակոչի ենթակա անձինք

ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ		ԶՊԱՏՎԱՍՏՎԱԾ ԿԱՄ ԱՆՂԱՅՑ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՅՈՒՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿՈՎ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՆՉԵՐԸ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐ
ՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ	ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
Ծնվելուց հետո՝ 0-24 ժամվա ընթացքում	ՎՅԲ	Մինչև 15 օրականը
Ծնվելուց հետո՝ 0-48 ժամվա ընթացքում	ԲՑԺ	Մինչև 12 ամսականը՝ մինչև 8 շաբաթ, առանց տուբերկուլինային փորձի, 8 շաբաթ. մինչև 12 ամս. փորձը դնելուց հետո
6 շաբաթական	ԱԿՐՓ/ՎՅԲ/ՅԻԲ/ԻՊՊ, ՌՈՏԱ, ՊՆԵՎՄՈ (դիֆթերիա, փայտացում, կապույտ հազ, վիրուսային հեպատիտ Բ, հեմոֆիլուս ինֆլուենզա Բ տիպի, ինակտիվացված պոլիոմիելիտ)	Մինչև 12 ամսականը՝ - ԱԿՐՓ/ՎՅԲ/ՅԻԲ/ԻՊՊ, ՊՆԵՎՄՈ-3 դեղաչափ՝ 4 շաբաթ ընդմիջումով - ՌՈՏԱ - 1-ին դեղ.՝ մինչև 15 շաբաթ, եթե 1-ին դեղ. չի ստացել այլևս չի ստանա. եթե ստացել է՝ մինչև 32 շաբաթ. 2-րդ. դեղ. - ՊՆԵՎՄՈ՝ եթե մինչև 12 ամսականը չի ստացել, ապա մինչև 24 ամսականը՝ 2 դեղաչափ, 2 տար. -ից մինչև 18 տար.՝ 1 դեղ.
12 շաբաթական	ԱԿՐՓ/ՎՅԲ/ՅԻԲ/ԻՊՊ, ՌՈՏԱ, ՊՆԵՎՄՈ	
18 շաբաթական	ԱԿՐՓ/ՎՅԲ/ՅԻԲ/ԻՊՊ, ՊՆԵՎՄՈ	
12 ամսական	ԿԿԽ-1	ԿԿԽ՝ 1-ին դեղ. մինչև 18 տարեկանը
12 ամսական	ԶՐԾԱՂԻԿԻ ԴԵՄ /2024թ-ից/	1-ին դեղ.՝ 2024թ-ից՝ 12 ամս. և 15-16 տ.՝ 2 դեղ.՝ 4 շաբաթ ընդմիջում
18 ամսական	ԱԿՐՓ/ԻՊՊ	1-5 տարեկանը - ԱԿՐՓ/ՎՅԲ/ՅԻԲ/ԻՊՊ-3 դեղաչափ՝ 4 շաբաթ ընդմիջումով, 6 ամիս անց՝ ԱԿՐՓ/ԻՊՊ
4-6 տարեկան	ԿԿԽ-2	Մինչև 18 տարեկանը
4-6 տարեկան	ԶՐԾԱՂԻԿ	2-րդ. դեղ.՝ 2027թ-ից
6 տարեկան	ԱԿՐՓ/ԻՊՊ	6-14տ 14տ 11 ամս 29 օր՝ ԱԿՐՓ/ԻՊՊ-3 դեղաչափ՝ 4 շաբաթ ընդմիջում
13 տարեկան աղջիկներ	ՄՊՊ (մարդու պայպիլոմավիրուսային վարակ)՝ 2 դեղաչափ 6 ամիս ընդմիջումով	14տ 11 ամս 29 օրակ-ից բարձր՝ մինչև 45 տ.՝ 3 դեղ.՝ 0, 2, 6 ամիս ընդմիջում
15-16 տարեկան	ԱՓՂԿ (ադաստել)	ԱՓՂԿ՝ 3 դեղաչափ՝ 4 շաբաթ ընդմիջում, մինչև 18 տարեկանը
15-16 տարեկան նախազորակոչի ենթակա անձինք	ԶՐԾԱՂԻԿ	2 դեղաչափ 4 շաբաթ ընդմիջում /2024թ-ից/
	ՄԵՆԻՆԳՈ, ՊՆԵՎՄՈ, ՎՅԱ (վիրուսային հեպատիտ Ա)	16-ից բարձր՝ նախազորակոչ-զորակոչի ենթակա անձինք
	ԿԿԽ	2 դեղաչափ չունեցողներին
17 տարեկան նախազորակոչի ենթակա անձինք	ՏՈՒԱՐԵՄԻԱ	17-ից բարձր զորակոչի ենթակա անձինք